

# LE BLAIREAU *Meles Meles*

Le blaireau est répandu dans presque toute l'Europe, essentiellement forêts mais aussi prairies, marais, montagnes jusqu'à 2000m. C'est la plus grosse espèce de Mustélidés d'Europe.

- 70 cm de long (90 cm avec la queue)
- 25 à 30 cm au garrot
- jusqu'à 20kg (12 kg en moyenne).
- Durée de vie : 15 ans environ en captivité et 4 ou 5ans en milieu naturel.



## COMPORTEMENT

- Caractère discret et farouche, totalement inoffensif.
- Essentiellement nocturne et crépusculaire pendant les nuits courtes de l'été (de Mai à Aout).
- Vision faible...
- Odorat plus de 700 fois supérieur au nôtre! Il lui permet trouver sa nourriture mais aussi de se déplacer la nuit et.. de repérer ses prédateurs.
- Pattes griffues puissantes qui permettent de creuser, de déplacer la terre ou de courir jusqu'à 30km/h.



- Il vit en groupe ou clan comptant en moyenne 5 individus.
- Une même odeur pour un clan.
- Il présente un haut degré de philopatrie (tendance à revenir au lieu de naissance)

# ALIMENTATION

Opportuniste, il adapte son comportement alimentaire à son aire de répartition. Il varie en fonction des saisons. Il utilise l'odorat (végétaux) et l'ouïe (animaux) .

- Nourriture animale durant le printemps et l'été:  
Vers de terre, micro mammifères et même charognes
- Nourriture végétale par griffage et fouissage; fin d'été et automne:  
Racines bulbes, fruits, aliments récoltés en surface
- La ration alimentaire varie entre 400 et 650gr/jr.

En remuant la terre, il aère le sol et facilite le développement des végétaux .  
Occasionnellement, il peut se nourrir dans les champs de blé ou de maïs



Griffe antérieure

# RYTHMES D'ACTIVITES ET DEPLACEMENTS

## En France, il est actif toute l'année,

- soumis à l'influence des saisons, d'habitat (milieu urbain, forêt, zone agricole).
- le repos au gîte durant la journée et l'activité en surface pendant la nuit avec une phase de repos hivernal ... et donc moins de sorties.
- La distance parcourue peut varier de 0 mètre en hiver à plus de 9 km.

## Organisation sociale

Une vie aussi bien solitaire que familiale ou communautaire.

Les activités de groupe:

Toilettage, épouillage,

Jeux

Marquages olfactifs de ses congénères et du territoire grâce à ses glandes péri-anales et ses laissées dans les pots.



# INDICES DE PRESENCE



Traces de griffures  
Marquage territoire



Empreinte patte  
Blaireau (et  
chevreuil)



Pot ou latrines  
Marquage territoire

# REPRODUCTION ET ELEVAGE DES JEUNES

- Population stable limitée en fonction de la nourriture disponible. 70% mortalité chez les blaireautins.
- Accouplement: prédominance Janvier à Mars.
- Ovule fécondé bloqué pendant 10 mois (ovoplantation différée) pour s'implanter en décembre. La vraie gestation ne dure que 6 à 7 semaines.
- 1 seule portée de 2 ou 3 petits par an.
  - poids 75gr à 130gr ; pas plus de 15cm avec la queue. Aveugles et sourds à la naissance.
  - 1ères sorties vers l'âge de 8 semaines.
  - Sevrage: vers l'âge de 4 mois, mortalité importante.
  - Maturité sexuelle des mâles vers 12/15 mois et femelles fécondables **vers 13 ou 14 mois.**




# HABITAT

- Le blaireau est un super terrassier. Il vit dans un terrier qu'il ne cesse d'agrandir d'année en année.
- Certains terriers sont occupés et agrandis par des générations successives pendant des décennies voire des siècles.
- Les galeries vont jusqu'à 5 m de profondeur sur 2 ou 3 niveaux.
- Elles sont interrompues par des chambres: lieux de reproduction et abri contre le froid.
- 1 terrier principal et des terriers secondaires (lieux de repos ou de refuge).
- Le nombre d'entrées (gueules): 6 à 8 en moyenne reconnaissables aux déblais à l'entrée.
- Ce terrier sert de refuge à d'autres espèces (renard, lapin, chauve-souris..)

Ces chambres servent à dormir ou à se reposer sur des litières constituées de feuilles, de mousse, de fougère et d'herbacées fréquemment changées car les blaireaux sont très propres.




Entrée terrier






Date de l'observation	25.11.2021 matin
Observateur(s)	Marie-Christine LERMUZEUX
Source	Biodiv.Sone (type: espèce)
Espèce identifiée	<b>Blaireau</b> (Mammifères)
Quantité	1 (comptage)
Lieu	<b>Allée des Pins</b>
Commune	<b>Saint-Orens-de-Gameville</b>
Code INSEE	<b>31506</b>
Détails	<p>Terriers de blaireau dans une haie en bordure de friche agricole.</p> <p>Les coulées (sentiers) sont bien marquées. On compte 9 gueules (entrées). On voit bien les déblais récents en forme de gouttière de la gueule principale .</p> <p>Quelques crottes de lièvres peuvent signifier un partage de terriers ?</p> <p>Une empreinte au milieu de celles des biches confirme la présence de blaireaux</p>





Date de l'observation	02.12.2021 matin
Observateur(s)	Marie-Christine LERMUZEAUX
Source	Biodiv.Sone (type: espèce)
Espèce identifiée	<b>Blaireau</b> (Mammifères)
Quantité	1 (comptage)
Lieu	<b>undefined</b>
Commune	<b>Saint-Orens-de-Gameville</b>
Code INSEE	<b>31506</b>
Détails	Retour à la blaireautière observée le 22 novembre. Indices de récolte de feuilles sur plusieurs entrées pour tapisser les chambres de "sire Tesson". Traces de nourrissage : trous de fouille ,10 à 15 cm de diamètre. Découverte d'une entrée sans coulée à quelques mètres dans le champ.



# Date de chasse en Haute-Garonne: Du 12 septembre 2021 au 28 février 2022

Dans les années 80-90, beaucoup de blaireaux ont été gazés dans leurs terriers parce que les renards étaient atteints par la rage .

La seule gêne peut venir de l'emplacement de leur terrier, dans les cultures, le vignoble, les remblais routiers ou ferroviaires. (GEPMA\*)

Visites au potager: peuvent être évitées avec les répulsifs olfactifs.

Vecteurs de tuberculose bovine? aucun cas de persistance de l'infection chez le blaireau n'a été observé dans les zones où la tuberculose a été éradiquée chez les bovins, ce qui tend à penser que le blaireau n'est pas un hôte de maintien de la tuberculose dans le milieu sauvage.

Le GEPMA\* propose gratuitement aux agriculteurs le conseil et l'aide d'experts pour l'emplacement de leur terrier

Malgré cela, il est chassé, notamment en France et souvent de manière cruelle.



**Déterrage**  
(vénerie sous terre)

\***G**roupement d'**E**tude et de **P**rotection des **M**ammifères d'**A**lsace

# ANNEXES

Vidéo: montage Benoit LERMUZEAUX

## LIENS UTILES

<http://www.meles.fr/>

[http://biodiv.sone.fr/spip.php?article21&var\\_mode=calcul](http://biodiv.sone.fr/spip.php?article21&var_mode=calcul)

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/blaireaux-animaux-nuisibles-inutiles-victimes-chasse-cruelle-1784007.html>

<https://www.cher.gouv.fr/Actualites/Statut-et-mode-de-regulation-du-blaireau-rappels-reglementaires>