

GESSES observées le 2 juin

Gesses jaunes (une seule paire de folioles)

- **Gesse des prés (*Lathyrus pratensis*)** Plus de 3 fleurs. Stipules aussi longues que les folioles (folioles en sagaies, fleurs jaunes avec étendard veiné de violet).
- **Gesse annuelle (*Lathyrus annuus*)** 1 à 2 petites fleurs jaunes

Gesses roses ou rouges

- **Gesse de Nissolle (*Lathyrus nissolia*)** Sans vrille ! 1 seule foliole graminéoïde, fleurs rouges au bout d'un très long pédoncule.
- **Gesse des bois (*Lathyrus sylvestris*)** Avec vrille ! fleurs rosées faisant penser au Pois de senteur mais sans odeur. Tiges nettement ailées. Feuilles à 2 folioles et terminées par une vrille. Stipules fines, peu étroites ce qui la distingue de *L. latifolia*. Gousses de 5,5 cm donc plus courtes que *L. latifolia*.

Gesse bicolor (bleue et blanche)

- **Gesse hirsute (*Lathyrus hirsutus*)** : Une à 2 fleurs bicolores (carène blanche, étendard mauve-violet), des feuilles à 2 folioles terminées par des vrilles, de très fines stipules, une tige ailée, des gousses poilues. La fleur bicolor bleue et blanche peut faire penser à Vesce de Bithynie.



VESCES observées le 2 juin

Vesces violet foncé

- **Vesce à feuilles dentées** (ou de Narbonne) : *Vicia narbonensis* subsp. *serratifolia* : tige carrée, feuilles à (3/4 paires) de folioles dentées, assez grands terminés par vrille, bractées dentées, calice à dents inégales.

Il existe aussi la **Vesce de Narbonne** (*V. narbonensis* subsp. *narbonensis*) distinguée de la précédente par ses feuilles non dentées, sauf les ultimes un peu dentées dans leur partie terminale.

Vesce violet, nombreuses fleurs d'un seul côté

- **Vesce velue** (*Vicia villosa*) : Belles feuilles pennées terminées par des vrilles, fleurs d'un seul côté, (limbe de l'étendard plus court que l'onglet donc différente de *Vicia cracca* ou *V. tenuifolia*). Avons vu *Vicia villosa* subsp. *varia* vu que les poils sont appliqués le long du pédicelle des feuilles.
A noter que si les feuilles et la tige sont velues, ce qui n'est vraiment visible qu'à la loupe, les gousses sont glabres.

Vesce bicolore (bleue et blanche)

- **Vesce de Bithynie** (grandes stipules dentées, 2 paires de folioles allongés et vrille, fleurs bicolores crème et violette, tige quadrangulaire. Bithynie = Région à l'Est du détroit du Bosphore actuellement en Turquie.

Vesce mauve (glande noires sur stipules)

- **Vesce cultivée** (*Vicia sativa*) :
- glandes nectarifères noires sur stipules découpées (attirent les fourmis).
Folioles échancrés à l'extrémité et petite pointe (mucron)
Nombreuses folioles pennées, vrille



TRÈFLES observés le 2 juin

Caractéristiques des Trèfles :

Feuilles trifoliées, stipules plus petites que les folioles, inflorescences en têtes globuleuses ou allongées, pétales persistant sur le fruit, gousses très petites (jamais plus longues que le calice !). Plantes herbacées basses.

- **Trèfle à feuilles étroites (*T. angustifolium*)** : inflorescence très allongée, fleurs rosées.
- **Trèfle champêtre (trèfle jaune) :**
 - Etendard en cuillère membraneuse et striée, folioles dentées, sans mucron, foliole centrale avec pétiole assez grand, plus grand que les pétioles quasi inexistantes des autres folioles. En se fanant, les fleurs deviennent brunes.
- **Trèfle bitumineux (*Bituminaria bituminosa*)**
 - Les feuilles froissées dégagent une odeur de bitume tout à fait caractéristique.

